

07/ 2019

**Naziv: Povezanost depresivnosti, anksioznosti i obrasca emocionalne privrženosti kod patoloških kockara**

**Istraživač: Marija Zekonja**

**Mentor: prof. dr Saveta Draganić Gajić**

Patološko kockanje je globalni fenomen sa visokom prevalencom u mnogim zemljama. Bihevioralna zavisnost prepoznata je kao mentalni poremećaj koji karakterišu obrasci kontinuiranog kockanja, uprkos značajnim negativnim posledicama na psihološkom, poslovnom i porodičnom planu. Pored zloupotrebe alkohola i psihoaktivnih supstanci, depresivni poremećaj i anksiozni poremećaji su najčešći komorbiditetni mentalni poremećaji kod zavisnika od kockanja. Iz ugla teorije emocionalne privrženosti, patološko kockanje i razvoj zavisničkih ponašanja može se posmatrati kao poremećaj afektivnog vezivanja.

Istraživanje je imalo za cilj ispitivanje povezanosti između depresivne simptomatologije (depresivnog poremećaja) merene Bekovim inventarom depresivnosti (BDI), nivoa anksioznosti (anksioznog poremećaja) merene Bekovim inventarom anksioznosti (BAI) i obrasca emocionalne privrženosti merene Skalom iskustava u bliskim odnosima (ECR), u populaciji patoloških kockara (N=56), kao i moguće razlike u odnosu na ispitanike u opštoj populaciji (N=84). Suprotno očekivanjima, dobijeni rezultati studije pokazali su da su nivoi depresivnosti i anksioznosti minimalni u populaciji patoloških kockara i da nema značajne razlike u odnosu na ispitanike iz opšte populacije. Sa druge strane, potvrđena je hipoteza o postojanju nesigurnog obrasca privrženosti u populaciji patoloških kockara (odbacujući i bojažljivi obrazac), ali takođe, rezultati istraživanja pokazuju da nema značajne razlike između ispitivanih grupa.

English version

Pathological gambling is a global phenomenon with a high prevalence in many countries. Behavioral addiction is recognized as a mental disorder characterized by continuous gambling, in spite of significant negative consequences it has on a personal, professional and family life. Besides alcohol and drug abuse problem, depression and anxiety disorders are the most common comorbid disorders in pathological gamblers. From the angle of attachment theory, pathological gambling and the development of addictive behaviors can be interpreted as an attachment disorder. This research aimed to examine the relationship between depressive symptomatology (depressive disorder) with *Becks depression inventory* (BDI), anxiety level (anxiety disorder) with *Becks anxiety inventory* (BAI) and the attachment type with the *Experiences in close relationship* Scale (ECR) in the population of pathological gamblers (N=56), as well as to compare the findings with a general population (N=84). Contrary to predictions, results showed that levels of depression and anxiety in pathological gamblers are minimal, with no difference from the general population. On the other hand, as hypothesized, insecure attachment (including avoidant and fearful) was found to be most common among pathological gamblers, but here too, there was no difference between clinical and general population.

*Keywords: bihevioral addiciton, pathological gambling, depressive disorder, anxiety disorder, attachment theory*